

OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule : 2 fr.)

72,896

---

**MÉLANGES**  
**EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES**

SEPTIÈME FASCICULE

(30 Septembre 1913)

PAR

**MAURICE PIC**

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE  
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE  
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »  
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS  
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES  
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

---

**MOULINS**  
**IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE**

ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1913

Tous droits réservés

WATER

WATER

WATER

## Nouveaux Genres et nouvelles Espèces de Cyphonides <sup>(1)</sup>

---

**Theriomorphus** n. g. Antennis subfiliformibus, pubescentibus, capite subverticale, oculis magnis ; thorace antice subarcuato, lateraliter postice carinato ; elytris elongatis ; pedibus satis validis, tibiis hirsutis, tarsis brevibus, quadriarticulatis, articulo penultimo modice appendiculato.

Antennes presque filiformes et un peu robustes, pubescentes ; tête subverticale, visible du dessus, yeux très grands et saillants ; prothorax subarqué et un peu étranglé en avant, ne surplombant pas la tête, muni d'une arête latérale effacée en avant ; élytres allongés, pas plus larges que le prothorax ; pattes assez robustes, tibias ornés de poils raides, tarses courts, ayant 4 articles distincts, le pénultième étant très peu appendiculé en dessous.

Par sa forme rappelle le genre *Therius* Guérin dont il se distingue facilement par le prothorax à arête incomplète et les tarse différents, d'ailleurs, d'un autre groupement et voisin par la forme de ses tarse du genre *Ptilodactyla* Latr.

**Theriomorphus niasensis** n. sp. Subconvexus, nitidus, griseo sat sparse pubescens, niger, thorace, scutello pedibusque testaceis.

Un peu convexe, brillant, revêtu d'une pubescence grise longue, un peu espacée et en partie soulevée. Noir avec le prothorax, l'écusson et les pattes testacées. Tête grosse, à ponctuation assez fine et peu serrée ; antennes noires, à 1<sup>er</sup> article un peu roussâtre, 2<sup>e</sup> article petit et court, suivants longs et un peu élargis au sommet, d'où subdentés, 11<sup>e</sup> assez court, subtronqué au sommet ; prothorax pas très court,

---

(1) Tous les types des nouveautés décrites dans cet article et les suivants font partie de ma collection.

fortement rétréci en avant, sinué postérieurement, muni d'un rebord latéral effacé en avant, à ponctuation pupilleuse écartée ; écusson large, subtriangulaire ; élytres pas plus larges que le prothorax, parallèles, un peu rétrécis à l'extrémité, finement striés avec les intervalles à ponctuation granuleuse ; dessous du corps presque entièrement foncé, pattes robustes, tibias un peu arqués, munis d'éperons terminaux très distincts. Long. 6 mill. Ile Nias (Kannegieter).

**Cistelocyphon** n. g. Antennis simplicibus, articulis 4 et sequentibus validis ; capite verticale, oculis magnis ; thorace antice subarcuato, lateraliter et antice distincte marginato ; elytris brevibus, striatis ; pedibus satis validis, tarsis mediocre elongatis, quadriarticulatis, articulo penultimo mediocre appendiculato.

Antennes simples, grêles à la base mais épaissies à partir du 4<sup>e</sup> article ; tête verticale, non visible en dessus, yeux gros et saillants, éloignés du bord antérieur du prothorax ; prothorax subarqué en avant, nettement et complètement rebordé ; élytres courts et larges, striés ; pattes assez robustes, tarse pas très courts ayant 4 articles distincts, le pénultième étant médiocrement appendiculé en dessous.

Ce nouveau genre ressemble, avec une forme un peu plus trapue, à certains *Synallecula* Kolbe (1) (Hétéromères) mais rentre dans les Cyphonides en se rapprochant par ses tarse du genre *Ptilodactyla* Latr. dont il est très distinct par son prothorax en demi-cercle, nettement et complètement rebordé, conjointement à la forme courte et trapue du corps.

**Cistelocyphon breve** n. sp. Brevis et latus, nitidus, griseo pubescens, niger, infra corpore, antennis pedibusque pro parte rufescentibus, antennis ad basin tarsisque testaceis.

Court et large, brillant, revêtu d'une pubescence grise longue, en partie redressée et écartée, densément et ruguleusement ponctué sur l'avant-corps, fortement strié sur les élytres, noir, avec le dessous du corps et les membres en

---

(1) *Synallecula apicicornis* Pic rentrant dans les *Alleculidæ*.

partie roussâtres, base des antennes et tarses testacés. Tête bien plus étroite que le prothorax ; antennes assez longues, à 2<sup>e</sup> article plus épais et plus court que 3<sup>e</sup>, celui-ci mince, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> longs et un peu épais, suivants plus épais ; prothorax court et large, en demi-cercle, impressionné de chaque côté sur la base, sinué postérieurement ; écusson court et large, en demi-cercle ; élytres pas plus larges que le prothorax, subovales, courts et larges, à épaves anguleuses, fortement striés avec les intervalles un peu granuleux ; dessous du corps un peu roussâtre ; pattes un peu roussâtres avec les tarses testacés, tibias droits. Long. 2 mill. N<sup>lle</sup> Guinée : Andai.

**Hovactyla rufescens** n. sp. Elongatus, subdepressus, nitidus, griseo sat sparse pubescens, rufus, antennis pedibusque pallidioribus.

Allongé, brillant, un peu déprimé, assez éparsément pubescent de jaune, roux avec les élytres un peu rembrunis sur le disque, antennes et pattes testacées. Tête biimpressionnée entre les yeux, à ponctuation fine et écartée, yeux gros, noirs ; antennes assez épaissies, à 2<sup>e</sup> article court, 3<sup>e</sup> long, de la longueur du 4<sup>e</sup>, derniers plus longs et moins épais ; prothorax en demi-cercle, déprimé postérieurement, à arête latérale presque complète, explané sur les côtés postérieurement, à ponctuation fine et très écartée sur le disque ; écusson allongé ; élytres peu plus larges que le prothorax, subparallèles, rétrécis à l'extrémité, striés avec les intervalles éparsément ponctués ; pattes assez grêles. Long. 5,5 mill. environ. Madagascar : Fianarantsoa.

Je ne pense pas me tromper en plaçant cette espèce dans le genre *Hovactyla* Fairm. Diffère de *H. dermestoides* Fairm. (ex description) au moins par la coloration plus claire, l'aspect plus brillant, la tête biimpressionnée.

? **Stenactyla** (1) **Donckieri** n. sp. Angustatus, ni-

(1) Je ne me représente pas exactement ce genre par sa description, c'est pourquoi je lui attribue dubitativement la présente espèce.

tidus, griseo pubescens, testaceus, pedibus pallidioribus oculis nigris.

Etroit et allongé, atténué postérieurement, revêtu d'une pubescence grise espacée, testacé avec les pattes plus pâles, yeux noirs. Tête à ponctuation granuleuse, écartée, marquée entre les yeux d'une faible impression arquée, yeux gros, noirs ; antennes grêles, foncées à base testacée ; prothorax en demi-cercle, déprimé postérieurement, un peu convexe antérieurement, muni d'une arête latérale effacée en avant, à ponctuation pupilleuse espacée ; écusson large, cordiforme ; élytres pas plus larges que le prothorax, subparallèle, rétrécis à l'extrémité, strié-ponctués avec les intervalles éparsément ponctués ; pattes longues et grêles. Long. 4,5 mill. Congo français. Reçu de Donckier.

Diffère de *St. pallipes* Fairm. (ex description) par la coloration plus claire, la tête non densément ponctuée, la ponctuation différente du prothorax, etc.

**Falsodæmon n. genre.** Antennis subfiliformibus, apice paulo incrassatis, articulo 3<sup>e</sup> maximo ; capite subverticale, oculis magnis ; thorace antice subarcuato, lateraliter postice carinato ; tarsis quadriarticulatis, pro parte lamellatis.

Ce nouveau genre, très voisin de *Dæmon* Cast., a les avant-derniers articles des tarse appendiculés en dessous, mais le prothorax (par ce caractère le genre est facile à séparer) n'est pas complètement rebordé latéralement, sa carène latérale n'étant marquée que postérieurement et les antennes ont leurs derniers articles un peu épaissis.

**Falsodæmon madecassus.** Oblongo-ovatus, nitidus, griseo aut luteo pubescens, niger, antennis pro maxime parte pedibusque testaceis, elytris antice testaceis, postice nigris.

Oblong-ovale, brillant, revêtu d'une pubescence grise ou jaunâtre espacée, noir, avec environ la moitié basale des élytres testacée, moins l'extrême rebord et la suture noirs, pattes et antennes testacées, ces dernières obscurcies à l'extrémité. Tête modérément ponctuée, impressionnée trans-

versalement ; antennes à 2<sup>e</sup> article court, 3<sup>e</sup> article mince et long, 4<sup>e</sup> plus court, suivants un peu épaissis ; prothorax en demi-cercle, un peu étranglé en avant, déprimé sur la base, un peu élevé et convexe antérieurement, à ponctuation pupilleuse écartée ; écusson très large, subtriangulaire, sillonné au milieu ; élytres à peine plus larges que le prothorax, peu longs, un peu rétrécis au sommet avec des rangées de points et quelques faibles stries ; pattes un peu robustes. Varie par les élytres testacés avec l'extrême base seule bordée de noir **v. nov. pallidior**. Long. 5 mill. Madagascar : Tananarive.

**Artematopus** (1) **nigrocinctus** n. sp. Ovatus, convexus, nitidus, fere glaber, niger, elytris rubris, nigro cinctis, femoribus rufescentibus.

Cette espèce a les élytres rougeâtres, étroitement bordés de noir et peut se placer près de *A. suturalis* Guer., mais la forme est plus ovulaire, les élytres sont plus rouges et plus étroitement marqués de noir sur la suture. Long. 6 mill. Pérou : Rio Mixiollo (Baer).

**Artematopus discoidalis** n. sp. Ovatus, convexus, nitidus, sparse hirsutus, niger, abdomine pedibusque rufescentibus, elytris nigris, rufo cinctis.

Cette espèce a les élytres largement bordés de roux, l'avant-corps à ponctuation assez forte, plus rapprochée sur la tête ; elle se distingue de la précédente par sa coloration et ses élytres fortement striés. Long. 7 mill. Brésil.

---

(1) Ce genre fait partie d'une tribu particulière.

## Quelques Lycides nouveaux

---

**Lyropæus coccineicollis** n. sp. Satis elongatus, postice mediocre dilatatus, opacus, niger, thorace elytrisque coccineis.

Assez allongé, un peu élargi en arrière, opaque, noir, à peine brillant en dessous, avec le prothorax et les élytres d'un roux ocracé. Tête petite; antennes peu atténuées à l'extrémité; prothorax court, très rétréci obliquement en avant, creusé en dessus avec de vagues macules foncées, angles postérieurs très saillants; écusson foncé, fortement échancré au sommet; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, sinués près de la base, élargis en dessous du milieu, un peu rétrécis et séparément arrondis au sommet, marqués de trois petites côtes discales; pattes grêles. Long. 14 mill. Indes: Chambaganor.

Voisin de *L. Waterhousei* Gorh., de Sumatra, qui ne m'est connu que par la description, il paraît en différer au moins par le prothorax non caréné au milieu, les élytres tricotés.

**Calochromus palawanus** n. sp. Elongatus, postice dilatatus, nigro-subcœruleus, nitidus, elytris ochraceo-purpureis.

Allongé, élargi en arrière, brillant, noir à reflets bleutés, peu pubescent sur l'avant-corps et le dessous, avec les élytres pubescents, d'un pourpré-ocracé. Tête plus étroite que le prothorax; antennes dépassant le milieu du corps, aplaties, rétrécies à l'extrémité; prothorax en carré transverse, peu rétréci en avant, impressionné sur les côtés et le milieu postérieurement et marqué d'une dépression médiane transversale, arquée en avant; écusson court, subarqué au sommet; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, élargis en arrière et courtement rétrécis au sommet, ornés de petites côtes plus marquées vers la suture; pattes un peu aplaties, tibias antérieurs arqués. Long. 16 mill. Ile Palawan.



Voisin de *C. orbatus* Westw. mais élytres un peu élargis postérieurement, prothorax large, à peine rétréci en avant, etc.

**Calochromus viridicollis** n. sp. Elongatus, subparallelus, postice attenuatus, viridis aut cyaneo-viridescens, nitidus, elytris ochraceis.

Allongé, subparallèle, nettement atténué à l'extrémité, brillant et presque glabre sur l'avant-corps, le dessous et les membres qui sont métalliques verts ou d'un vert à reflets bleutés avec les élytres pubescents et ocracés. Tête plus étroite que le prothorax ; antennes assez courtes, robustes et aplaties ; prothorax court, arqué sur les côtés avec les angles antérieurs nuls, fortement impressionné sur le milieu et sur les côtés ; écusson métallique, court, tronqué au sommet ; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, parallèles, distinctement atténués à l'extrémité, ayant quelques traces de côtes peu marquées ; pattes aplaties, tibias antérieurs courts et arqués. Long. 10 mill. Java : Monts Tengger (Fruhstorfer).

Voisin du précédent par ses élytres concolores mais ceux-ci sont de forme différente, distinctement atténués au sommet, le prothorax d'un vert métallique a les angles antérieurs nuls.

**Calochromus borneensis** n. sp. Elongatus, postice dilatatus, nigro-subcœruleus, nitidus, elytris purpureis, apice late violaceo maculatis.

Allongé, élargi postérieurement, d'un noir à reflets bleus métallique, brillant et légèrement pubescent sur l'avant-corps et le dessous avec les élytres, sauf sur leur sommet, pubescents et pourprés. Tête avec les yeux presque de la largeur du prothorax ; antennes de la longueur du corps, aplaties, un peu rétrécies à l'extrémité ; prothorax en carré transverse, un peu rétréci en avant, sillonné sur le disque et impressionné de chaque côté en avant et en arrière ; écusson court, subtronqué en avant ; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez longs, élargis postérieurement et courtement rétrécis au sommet, marqués intérieurement de

plusieurs petites côtes ; pattes aplaties, cuisses antérieures denticulées en dessous à leur sommet avec les tibias arqués et un peu sinués en dedans. Long. 12,5 mill. Bornéo : Brunei.

Peut se placer près de *C. melanurus* Wat., les élytres sont autrement striés, la forme un peu différente, etc.

**Calochromus nigronotatus** n. sp. Angustatus, subparallelus, niger, thorace (in disco nigro notato) pro parte elytrisque purpureis.

Etroit, subparallèle, noir brillant avec le prothorax en partie et les élytres pubescents, pourprés. Tête petite, plus étroite que le prothorax ; antennes assez longues, aplaties, atténuées à l'extrémité ; prothorax assez court, très rétréci en avant, largement marqué de noir sur le milieu, à large sillon médian et larges impressions latérales postérieures ; écusson noir, court ; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, sans côtes nettes ; pattes aplaties. Long. 15 mill. Indes : Nilgiri Hills.

Voisin de *C. ruber* Wat. très distinct, à première vue, par son prothorax maculé de foncé.

**Calochromus giganteus** n. sp. Major, elongatus, niger, fronte, thorace pro maxime parte elytrisque testaceis.

Grand, allongé, noir, brillant en dessous et sur les membres, presque mat sur le dessus, front, prothorax (avec une macule postmédiane noire) et élytres testacés, assez densément pubescents de flave. Tête plus étroite que le prothorax, noire à vertex pubescent de testacé ; antennes courtes et aplaties ; prothorax transversal, un peu rétréci en avant, sinué latéralement et postérieurement, sillonné au milieu, modérément impressionné sur les côtés ; écusson assez petit, foncé ; élytres à peine plus larges que le prothorax, longs, peu élargis vers le milieu, un peu atténués à l'extrémité, ayant plusieurs côtes distinctes ; pattes aplaties, tibias antérieurs sillonnés. Long. 21 mill. Indes (coll. Pic, ex coll. Gorham).

Espèce ayant, comme la précédente, le prothorax maculé de foncé, mais cette macule est postérieure, non transver-

sale et la forme du corps est moins étroite. Remarquable par sa grande taille.

**Calochromus Gorhami** n. sp. Elongatus, niger, fronte, thorace, scutello elytrisque purpureis.

Allongé, noir, brillant en dessous et sur les membres avec le vertex, le prothorax, l'écusson et les élytres pubescents, pourprés. Tête un peu plus étroite que le prothorax ; antennes longues, aplaties avec le premier article épais ; prothorax transversal, à peine rétréci en avant, sillonné sur le disque, distinctement impressionné sur les côtés ; écusson long, tronqué au sommet ; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, très distinctement et pluricostés sur le disque ; pattes un peu aplaties, antérieures longues avec les cuisses denticulées en dessous et les tibias subsinués en dedans. Long. 17 mill. Indes : Khasi Hills.

Voisin du précédent par sa grande taille, mais prothorax immaculé, écusson pubescent de pourpré, etc.

**Calochromus madurensis** n. sp. Elongatus, parallelus, niger, elytris purpureis.

Allongé, parallèle, noir avec l'avant-corps, le dessous et les membres noirs, brillants, peu pubescents, élytres densément pubescents, pourprés. Tête plus étroite que le prothorax ; antennes courtes, un peu épaissies, atténuées à l'extrémité ; prothorax transversal, fortement sillonné au milieu, à plis et impressions latérales distinctes ; écusson long, tronqué au sommet ; élytres à peine plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, ayant sur le disque des traces de petites côtes ; pattes un peu aplaties. Long. 12 mill. Indes : Madura.

Voisin de *C. vesticollis* Gorh. mais prothorax moins transversal, non pubescent de pourpré et autrement sculpté.

---

## ESPÈCES ET VARIÉTÉS NOUVELLES, OU PEU CONNUES,

### RENTRANT DANS DIVERSES FAMILLES

---

**Ptinus abyssinicus** n. sp. Oblongus, luteo pubescens, nigro-æneus, pedibus validis, rufescentibus.

Oblong, revêtu d'une pubescence jaune assez dense avec quelques poils longs, soulevés, noir bronzé, pattes rous-sâtres, robustes. Antennes obscurcies, longues et fortes ; prothorax long, large en avant, étranglé près de la base, à ponctuation granuleuse, forte ; élytres ovalaires, à épaules nulles, faiblement strié-ponctués, avec les intervalles larges, subconvexes ; pattes longues et robustes. Long. 3 mill. Abyssinie.

A placer dans le groupe de nos espèces paléarctiques *Pseudoptinus* Reitt. et bien distinct par sa forme et ses pattes robustes.

**Anthracias holosericeus** n. sp. Parallelus, opacus, niger, elytris holosericeis. ♂ capite bicornuto.

Parallèle, opaque, noir avec les élytres revêtus, à l'état frais, d'une pubescence noire soyeuse. Tête presque plane ♀, un peu creusée chez ♂ et munie de deux cornes préoculaires longues, un peu recourbées en dedans, fortement et densément ponctué ; prothorax transversal, de la largeur des élytres, à ponctuation forte et rapprochée, moins marquée chez ♀ ; élytres très faiblement striés, et ponctué de petits points, moins visibles chez ♀. Long. 13 mill. Afrique Or. : Dar es Salaam.

Par sa pubescence élytrale à reflets soyeux se distingue facilement des espèces voisines en se rapprochant surtout de *A. Favareli* Pic.

**Bradymerus Pici Chat.** Cette jolie espèce, récemment décrite (*Bull. Fr.*, 1913, p. 311), dont le type originaire de Zanzibar fait partie de ma collection, est bleuâtre-métallique sur le dessus du corps et les pattes sont rous-

sâtres ; elle se reconnaît, à première vue, par cette coloration particulière.

**Cistelomorpha bisbimaculata** n. sp. Capite (inter oculos nigro notato) thoraceque rufescentibus, scutello elytrisque testaceis, his postice nigro maculatis, femoribus et infra corpore luteis, antennis (articulo primo rufo excepto), abdomine postice, tibiis tarsisque nigris.

Ovale-allongé, un peu brillant avec le prothorax presque mat, celui-ci très densément ponctué, tête moins densément ponctué, avant-corps roussâtre avec la tête marquée de noire entre les yeux, celle-ci assez longue ; antennes noires avec le 1<sup>er</sup> article roux ; écusson testacé ainsi que les élytres, ces derniers bimaculés de noir en dessous du milieu sur chacun, une macule interne allongée près de la suture, l'autre subtriangulaire touchant le bord, élytres fortement striés avec les interstries un peu élevés et ruguleux ; dessous du corps jaune avec les deux derniers segments noirs ; pattes noires avec les cuisses jaunes. Long. 11 mill. Ile Sumbawa.

Peut se placer près de *C. binna* Fairm., en diffère par le prothorax roux et les dessins noirs plus nombreux et différents sur les élytres.

**Cistelomorpha minahassana** n. sp. Luteo-testaceus, oculis, articulis 4-11 antennarum abdomineque apice nigris.

Ovale-allongé, un peu brillant, moins sur l'avant-corps, avec le prothorax densément ponctué ; tête longue ; élytres assez fortement strié-ponctué, interstries un peu convexes, finement ponctué, avant-dernier segment noir au milieu, testacé sur les côtés, dernier noir. Long. 12 mill. Célèbes : Minahassa.

A placer près de *C. melanopyga* Fairm. qui a l'avant-dernier segment de l'abdomen tout noir et les tibias foncés.

**Nemostira pallidimembris** n. sp. Nitidissimus, nigro-piceus, antennis, palpis pedibusque pallidis.

Très brillant, paraissant glabre, noir de poix avec les palpes, antennes et pattes d'un testacé pâle. Tête peu longue,

à peu près de la largeur du prothorax, sillonnée sur le vertex, à ponctuation assez forte, un peu écartée ; antennes à dernier article un peu plus long que le précédent ; prothorax peu plus long que large, un peu rebordé sur la base avec les angles un peu saillants, finement et éparsément ponctué ; élytres bien plus larges que le prothorax, subparallèles, un peu rétrécis à l'extrémité, finement strié-ponctués, interstries assez larges, lisses ; pattes assez grêles. Long. 10 mill. environ. Afrique : Sierra Leone.

Cette espèce, très distincte par sa coloration, peut se placer près de *N. rufa* Borch.

**Nemostira madecassa** n. sp. Elongatus, antice posticeque attenuatus, nitidus, fere glaber, rufescens, pro parte obscurior, antennis pedibusque plus minusve testaceis.

Allongé, rétréci aux deux extrémités, brillant, presque glabre, roux, obscurci par places notamment sur le prothorax et la partie postérieure de la tête, antennes et pattes testacées avec les cuisses rembrunies. Tête assez longue, plus étroite que le prothorax, yeux grands, rapprochés ; prothorax assez long et pas très étroit, à ponctuation moyenne, un peu rapprochée ; élytres pas très larges et longs, subsinuées latéralement, acuminés au sommet, assez fortement strié-ponctués. Long. 12 mill. Madagascar, environs de Tananarive.

Voisin de *N. tenuicollis* Fairm., mais prothorax distinctement ponctué, coloration un peu différente et taille plus avantageuse.

**Arthromacra (Chlorophila) apicicornis** n. sp. Elongatus, postice subacuminatus, viridi-metallicus, infra corpore pedibusque pro parte testaceis, palpis antennisque nigris, his apice testaceis, elytris opacis, viridibus, lateraliter luteo limbatis.

Allongé, très atténué et subacuminé postérieurement, vert métallique à reflets cuivreux sur l'avant-corps avec le prothorax long, plissé transversalement ; élytres indistinctement striés, verts et mats, bordés de jaune avec les épi-

pleures testacés ; palpes et antennes noires, ces dernières avec le dernier article, celui-ci très long, testacé, et les 2 précédents tachés de roux au sommet ; pattes testacées avec le sommet des cuisses et les tarses foncés ; dessous du corps en partie testacé. Long. 17 mill. Indo-Chine.

Très voisin de *C. nitidicollis* Fairm. en diffère, à première vue, par les angles antérieurs du prothorax plus marqués et la coloration particulière des antennes.

**Lophophyllus rugicollis v. nov. punctaticollis.**

Niger, elytris subcupreis, thorace satis elongato, fortiter sat sparse punctato, ad basin valde sinuato. Long. 13 mill. Madagascar : Mahatsinjo. Reçu de Donckier.

Diffère de *L. rugicollis* Fairm. au moins par les caractères prothoraciques différents.

? **Derostira** (1) **laticollis** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris subcupreis, multi-costatis.

Allongé, brillant, noir, élytres un peu cuivreux. Tête ruguleuse, plus étroite que le prothorax, celui-ci large, à ponctuation forte, irrégulièrement disposée, fortement sillonné devant la base dont le bord est très relevé, un peu échancré au milieu ; antennes dépassant le prothorax, épaisses, 3<sup>e</sup> article long, subtriangulaire, 4<sup>e</sup> et suivants plus courts, plus larges et dentés, avant-derniers un peu plus étroits, dernier allongé, pas très long ; élytres bien plus larges que le prothorax, parallèles, courtement rétrécis et subarrondis au sommet, ornés de nombreuses côtes étroites avec les intervalles à ponctuation crénelée ; pattes antérieures plus robustes que les autres. Long. 9 mill. Madagascar : Mont Poraka. Reçu de Donckier.

Distinct de *D. crenulipennis* Fairm. (ex description) par la sculpture des élytres, le prothorax foncé, etc. ; rappelle, d'autre part, *Lophophyllus rugicollis* Fairm. avec des antennes de structure différente. Il ne serait pas impossible

---

(1) Je ne connais pas le type du genre *Derostira* Fairm., d'où le point de doute d'attribution générique de l'espèce *laticollis* ; la description de Fairmaire n'est pas très précise.

que cette espèce soit une ♀ du genre *Lophophyllus* Fairm. (dont le sexe ♂ seulement aurait été décrit), proche voisine, avec un plus large prothorax, de *L. rugicollis* v. *punctatocollis* mihi.

**Pyrochroa (Schizotus) testaceipennis** n. sp. Elongatus, niger, capite supra, thorace, scutello elytrisque testaceis.

Allongé, noir en dessous et sur les membres, dessus testacé, à peine brillant, assez densément pubescent de flave. Tête creusée entre les yeux, à carène large et triangulaire placée entre les antennes ; antennes flabellées, pas très épaisses, 3<sup>e</sup> article court, prolongé latéralement en pointe aiguë ; prothorax subarrondi sur les côtés, rebordé postérieurement, marqué sur le disque d'impressions nettes, médianes et latérales ; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, séparément arrondis au sommet avec, sur le disque, des traces de faibles côtes. Long. 11 mill. Java.

Diffère, à première vue, de *S. rotundicollis* Pic, par la coloration uniforme des élytres et la forme plus grêle.

**Pyrochroa (Schizotus) sulcaticeps** n. sp. Elongatus, niger, capite supra, thorace, scutello et elytris antice late testaceis.

Très voisin de l'espèce précédente, forme de la tête analogue mais prothorax moins nettement impressionné, non sensiblement rétréci en avant, élytres un peu moins allongés, de coloration très différente, ces organes étant testacés à la base, noirs à l'extrémité sur un peu moins de leur moitié, la coloration noire remontant sur la suture et un peu aussi sur les côtés. Long. 11 mill. Java : Mont Gede.

**Pyrochroa (Schizotus) javanus v. nov. reductus.** Niger, collo, thorace, scutello, elytrisque ad basin et breve testaceis. Java : Pandalengan.

Diffère, à première vue, de la forme type par la coloration testacée très réduite sur la base des élytres.

**Pyrochroa apicalis** Pic, de Java, et **P. malaccana** Pic, de Malacca, sont deux espèces de coloration



analogue, à dessus du corps rouge avec partie de la tête et sommet des élytres noirs ; la première espèce a les élytres plus longs, leur macule apicale offrant un contour plus net, le prothorax est plus gibbeux en arrière et la tête non brillante postérieurement.

**Anthicus atricornis** n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pilosus et hirsutus, rufus, capite, antennis, femoribus apice, abdomine pro parte nigris, elytris rufis, lateraliter posticeque nigro notatis.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise, longue, en partie redressée, plus ou moins fortement et éparsément ponctué, roux avec la tête, les antennes, le sommet des cuisses et le milieu de l'abdomen noirs, élytres roux, ornés, sur les côtés, d'une macule noire en demi-cercle, partant du milieu et couvrant le sommet. Tête large, tronquée postérieurement, antennes grêles ; prothorax assez court, dilaté-arrondi en avant, presque droit sur les côtés devant la base ; élytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, peu rétrécis et subarrondis au sommet. Parfois les pattes sont en majeure partie foncées. Long. 3-5 mill. Madagascar : Mahatsinjo. Reçu de Donckier.

Voisin de *A. biplagiatus* Laf. et bien distinct par le dessin particulier de ses élytres ainsi que par les antennes toutes noires.

**Xamerpus metallicus** n. sp. Satis nitidus, metallicus, viridis aut violaceus, elytris ante medium aureo fasciatis, antennis pedibusque pro parte testaceis.

Cette nouvelle espèce est très distincte entre toutes celles du genre par la coloration métallique du dessus du corps, celle-ci étant verdâtre sur l'avant-corps et le pourtour des élytres, en partie violacée sur le disque de ces derniers organes avec une bande transversale ante-médiane à reflets dorés. Long. 3 mill. environ. Madagascar : Mahatsinjo.

A placer dans le voisinage de *X. vagepictus* Fairm.

**Melyris Schils. nec. Fabricius = Falsomelyris** mihi (nom nouveau) qui paraît différer de *Melyris* F. par la

forme moins étroite, ou moins atténuée en avant, les antennes non subfiliformes, à articles médians moins longs, plus ou moins épaissies, c'est-à-dire un peu dentées à partir du 5<sup>e</sup> article.

**Falsoanthocomus unifasciatus** n. sp. Elongatus, postice mediocre dilatatus, nitidus, fere glaber, niger, antennis pro parte tarsisque testaceis, elytris ad medium luteo fasciatis.

Allongé, médiocrement élargi en arrière, brillant, presque glabre, noir avec la majeure partie des antennes et les tarses testacés, élytres ornés, vers leur milieu, d'une étroite bande jaune qui n'atteint pas la suture et s'élargit un peu sur les côtés. Tête un peu plus large que le prothorax, celui-ci assez court ; antennes longues, testacées, à 1<sup>er</sup> article taché de foncé et 8 à 10 noirs ; élytres modérément longs, inégaux, creusés sur leur milieu, à carène sinuée, assez forte. Long. 3 mill. Madagascar, environs de Tananarive.

Très voisin de *F. nigricolor* Pic, prothorax plus court, forme moins allongée et élytres fasciés de clair.

**Tylocerus Kuhni** n. sp. ♂. Testaceus, capite pro parte, genibus, tarsis elytrisque apice nigris.

Modérément allongé, subparallèle, un peu brillant, pubescent de gris, testacé avec la tête en majeure partie, les genoux, tarses et sommet des élytres étroitement noirs. Antennes roussâtres avec les premiers articles tachés de noir, le premier article long et peu épaissi, le dernier grand et allongé ; tête noire, rousse en avant des antennes ; prothorax transversal, subcarré sur les côtés, obliquement rétréci latéralement en avant et en arrière ; élytres de la largeur du prothorax, parallèles, ruguleux ; abdomen obscurci sur les côtés au sommet. Célèbes : Tombugu (Kuhn). Long. 10 mill.

A placer près de *pectoralis* F., distinct, à première vue, par la coloration des pattes, la tête noire en arrière.

**Tylocerus testaceimembris** n. sp. ♀. Testaceus, elytris apice breve nigro notatis, pedibus pro parte brunescentibus.

Assez allongé, un peu élargi vers le milieu des élytres, presque mat, pubescent de gris, testacé avec le sommet des élytres brièvement marqué de noir, les antennes, partie des tibias et tarses un peu rembrunis. Tête petite, yeux noirs ; antennes médiocres, un peu épaissies, à 1<sup>er</sup> et dernier articles longs ; prothorax un peu plus large que long, presque droit sur les côtés, subarqué en avant, explané sur le pourtour ; élytres un peu plus larges que le prothorax, élargis vers le milieu, médiocrement ponctués. Long. 12 mill. Ile Palawan.

Très distinct du précédent par la forme et la coloration testacée des membres.

**Ichthyurus pallidithorax** n. sp. *Elongatus, nitidus, griseo pubescens, pallidulus, capite pro parte, antennis ad apicem, elytris in disco et lateraliter, segmento ultimo abdominalis nigris.*

Allongé, brillant, finement pubescent de gris, en majeure partie d'un testacé pâle avec la tête postérieurement, les antennes en majeure partie et le dernier segment abdominal noirs, élytres testacés ornés d'une macule foncée discale externe, ne touchant pas la suture. Tête assez large, simplement déprimée sur le vertex et assez finement ponctuée sur cette partie, noire avec le devant testacé ; antennes grêles, foncées avec la base testacée ; prothorax entièrement testacé, à peine plus long que large, rebordé, subcaréné au milieu ; écusson testacé ; élytres déhiscent, presque droits sur les côtés, sinués intérieurement, finement et irrégulièrement ponctués sur le disque ; abdomen testacé avec le dernier segment noir, celui-ci large et modérément fourchu ; pattes grêles, entièrement testacées. Long. 5 mill. 5. Haut Niger.

Peut se placer près de *I. discoidalis* Westw. dont il se distingue facilement par la coloration plus claire et la tête autrement impressionnée.

**Ichthyurus nigripennis** n. sp. *Elongatus, pro parte nitidus, griseo pubescens, niger, antennis femoribusque ad basin, capite, thorace lateraliter scutelloque pallidis, infra corpore nigro, antice pallido limbato aut maculato.*

Allongé, brillant avec la tête mate, pubescent de gris, presque entièrement noir, devant de la tête, base des antennes, côtés du prothorax, écusson, moitié basale des cuisses d'un testacé pâle, dessous du corps antérieurement brièvement maculé, ou bordé, de pâle. Tête large, non creusée, noire en arrière, testacée en avant ; antennes grêles, noires avec les premiers articles testacés en dessous ; prothorax un peu plus long que large, caréné sur les côtés, faiblement impressionné sur le disque en arrière, noir avec les côtés testacés ; écusson testacé ; élytres déhiscent, rugueux, subsinués sur les côtés et en dedans, noirs avec le repli huméral testacé ; abdomen noir avec les premiers segments maculés de testacé sur les côtés, dernier segment assez large, modérément fourchu ; pattes grêles, noires avec la première moitié des cuisses testacée. Long. 8 mill. environ. Formose : Fainan.

Cette espèce est facile à reconnaître par sa coloration presque entièrement noire et peut se placer près de *I. atriceps* Lewis.

**Ichthyurus apicipennis** n. sp. ♀. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, elytris apice et oblique testaceo-ochraceo notatis, antennis et femoribus ad basin testaceis.

Allongé avec les élytres relativement larges, brillant, pubescent de gris, noir avec la base des antennes et celle des fémurs testacée, élytres noirs à macule apicale oblique d'un testacé ocracé, remontant étroitement sur les côtés. Tête large, creusée entre les yeux ; antennes grêles, foncées à base testacée ; prothorax foncé, en carré long, un peu inégal sur le disque ; écusson foncé ; élytres larges, déhiscent, sinués sur les côtés et intérieurement, finement et subruguleusement ponctués, impressionnés au sommet, foncés avec le sommet d'un testacé ocracé et une étroite bordure latérale antérieure testacée ; abdomen foncé, dernier segment courtement et subtriangulairement entaillé ; pattes grêles, noires avec l'extrême base testacée. Long. 6 mill. environ. Formose : Fainan.

Paraît voisin de *I. parvulus* Gestro (ex description) et semble en différer par la coloration foncée de l'abdomen et celle différente des élytres.

**Trypherus Sallei** n. sp. Elongatus, nitidus, griseo-pubescens, nigro-piceus, elytris brunnescentibus, capite antice, antennis ad basin pedibusque pallidis. Long. 5 mill. 5. Mexique : Cordova (Salle in coll. Pic).

Ressemble un peu à *T. atricolor* (1) mihi, en outre de la coloration, en diffère par la tête un peu plus large que le prothorax, les élytres brunâtres, sans fortes impressions, le dernier segment abdominal assez fourchu et les pattes testacées.

**Belotus abdominalis var. nov. obscurior.** Niger, thorace postice et lateraliter elystrisque ad apicem testaceo limbatis. Panama : Bugaba (ex coll. Gorham). — Diffère de la forme type par la coloration plus foncée du prothorax et celle des pattes.

**Lobetus Le Moulti** n. sp. Elongatus, nitidus, supra niger, infra testaceus, antennis ad basin pedibusque testaceis, abdomine pro parte nigro, pro parte testaceo.

Allongé, brillant, médiocrement pubescent de gris, noir en dessus, testacé en dessous pattes comprises, abdomen en partie foncé. Tête bien plus large que le prothorax ; antennes aplaties à partir du 3<sup>e</sup> article, 1<sup>er</sup> long et épais, celles-ci testacées avec leur milieu rembruni ; prothorax un peu plus long que large, presque droit sur les côtés, angles antérieurs saillants, subcaréné au milieu, foncé avec les côtés vaguement roussâtres ; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez courts, déhiscent, presque droits sur les côtés, ruguleux, impressionnés avant le sommet qui est un peu relevé ; pattes longues et grêles, tibiais antérieurs un peu échancrés au sommet et cuisses aplaties en dessous. Long. 4,5 mill. Guyane Française : Saint-Laurent du Maroni. Reçu de Le Moult.

---

(1) Espèce brillante, entièrement foncée avec la base des antennes testacée, à tête creusée entre les yeux, prothorax court, élytres impressionnés, de Sumatra.

Voisin de *L. guadelupensis* Fl. Sallé mais coloration élytrale différente, entièrement foncée, en outre antennes plus aplaties, prothorax non sillonné, etc.

**Lobetus Hænschi** n. sp. Angustatus, nitidus, testaceus, capite, thorace, abdomine supra pro parte nigris, elytris nigris, apice testaceo guttatis.

Étroit, brillant, peu pubescent de gris, noir en dessus avec une petite macule testacée au sommet des élytres, testacé en dessous et sur les membres. Tête bien plus large que le prothorax ; prothorax plus long que large, presque droit sur les côtés, angles antérieurs marqués, subcaréné au milieu et déprimé sur les côtés ; élytres rugueux, nettement plus larges que le prothorax, subsinués sur les côtés, assez déhiscent ; pattes longues et grêles, tibias postérieurs un peu incurvés au sommet ; abdomen faiblement échancré et lobé au sommet. Long. 7 mill. Equateur : Santa Inez (R. Hænsch).

**Artematopus rufescens var. nov. obscuricolor.** Satis elongatus, postice attenuatus, rufescens, thorace elytrisque nigro-piceis, his metallicis. Panama (coll. Pic).

Diffère de la forme type par la coloration plus foncée du dessus du corps.

**Artematopus luteonotatus** n. sp. Ovatus, convexus, nitidus, sparse hirsutus, niger, angulis antice thoracis elytrisque, his striato-punctatis, luteo notatis, pedibus pro parte rufescentibus.

Cette espèce a les élytres maculés de jaune à la base vers l'écusson, en dessous des épaules et latéralement avant le milieu, enfin peu distinctement vers le sommet. L. 4 mill. Brésil : Goyaz.

Voisin de *A. conicicollis* Kirch, ponctuation et coloration différentes.

---

TITRES DES ARTICLES  
CONTENUS DANS LE SEPTIÈME FASCICULE

---

	Pages
Nouveaux genres et nouvelles espèces de Cyphonides. . . .	1
Quelques Lycides nouveaux . . . . .	6
Espèces et variétés nouvelles, ou peu connues, rentrant dans diverses familles . . . . .	10

---

